



CALFIX 2.0[®]

Pienso dietético complementario para vacas de leche que reduce el riesgo de fiebre de la leche

Componentes analíticos y niveles:

Proteína bruta	20.0	%
Aceites y grasas brutas	1.5	%
Fibra bruta	9.1	%
Cenizas brutas	11.2	%
Calcio	0.12	%
Fósforo	1.93	%
Sodio	0.30	%
Magnesio	1.00	%

Aditivos (por kg):

Vitaminas, pro-vitaminas y sustancias bien definidas con efecto análogo:

E 672	Vitamina A	33333	IU
E 671	Vitamina D3	10000	IU
3a700	Vitamina E /todo rac -alfa-tocoferol acetato	366	IU (*)

Composición de oligoelementos

E4 Cobre – Cu, Sulfato de cúprico pentahidratado (como Cu) 53 mg; E4 Cobre – Cu, Quelato cúprico de aminoácidos hidratado 26 mg; E5 Manganeseo – Mn, Sulfato de manganeseo monohidratado (como Mn) 133 mg; E6 Zinc – Zn, Oxido de Zinc (como Zn) 80 mg; E6 Zinc – Zn, Quelato de Zinc de aminoácidos hidratado 53 mg; E8 Selenio – Se, Selenito sódico (como Se) 0,9 mg; E8 Selenio – Se, 3b8.11 Orgánico producido por *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 (como Se) 0,66 mg; E3 Cobalto – Co, Carbonato básico de cobalto, monohidratado (como Co) 2,6 mg; E2 Iodo – I, Iodato cálcico (como I) 2,6 mg.

Urea y sus derivados:

Urea – 12 g.

Maxcare Calfix aporta un total de proteína bruta de 17.4 % además del NNP (nitrógeno no proteico).

Notas:

(*) Contiene una mezcla de sustancias aromatizantes que ahorran 333 IU vitamin E. Esta mezcla reemplaza la función antioxidante de la vitamin E.

Composición:

Cilindro de Arroz desgrasado, trigo, pulpa de remolacha azucarera, vinazas, harina de extracción de colza, proteína de patata, sal.

Aplicación:

Administrar de acuerdo a la siguiente table durante 15-21 días antes del parto.

La cantidad depende del nivel de Calcio en la dieta en last 3 semanas anteriores al parto. No administrar tras el parto.

Ingesta de Ca (gramos/vaca y día)	Dosis recomendada de CalFix 2.0 (kg)
60	4
55	3.5
50	3.0
45	2.5
40	2.0
35	1.5

