



Rediar

FARM-O-SAN Rediar

Rediar es un tratamiento efectivo para problemas digestivos en terneros hasta una edad de 6 meses.

Rediar es seguro, puede ser aplicado solo o en combinación con medicaciones o en situaciones donde se observen trastornos digestivos. Rediar aporta salud intestinal y fortalece la función digestiva. Rediar también aporta electrolitos y energía para una rápida recuperación de los animales.

Generalidades

Nombre del producto	Farm-O-San Rediar
Tipo de alimento	Complemento dietético alimenticio que restablece la hidratación y el balance de electrolitos en terneros hasta una edad de 6 meses.
Envasado	Cubos blancos de PE
Cantidad neta	3,5 kg cubo / 100g sobre
Caducidad	12 meses
Condiciones de almacén:	Almacenar en paquete cerrado en lugar fresco, oscuro y seco.

Especificaciones

Componentes y niveles analíticos

Proteína bruta	6.3%
Aceites y grasas brutos	0.7%
Fibra bruta	0.4%
Ceniza bruta	16.2%
Sodio	4.4%
Potasio	0.8%
Cloro	4.1%

Aditivos por kg

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo	
Vitamina A (E 672)	250,000 UI
Vitamina D/ Vitamina D3 (E 671)	2,375 UI
Vitamina E / todo-rac-alfa-tocoferil acetato (3a700)	1,625 UI
Oligoelementos o compuestos de oligoelementos	
Sulfato manganeso, monohidratado, Manganeso-Mn (E5)	138mg
Zinc quelato de aminoácidos, hidrato, Zinc-Zn (E6)	70mg
Zinc óxido, Zinc-Zn (E6)	
Quelato cúprico de amino ácidos hidratado, Cobre-Cu (E4)	95mg
Sulfato cúprico, pentahidratado, Cobre-Cu (E4)	8mg 1 mg
Microorganismos	
<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 10415 (E1705)	6.3x10 ⁹ CFU

Composición:

Dextrosa, Almidón de maíz, Cloruro sódico, Sodio, levadura en polvo, Lactosa, Almidón de trigo pregelatinizado, Aceite vegetal (Aceite de palma, Aceite de coco, Aceite de girasol), Proteína de suero en polvo, Fumarato magnésico.



FARM-O-SAN
Animal Health Products

Rediar

Modo de empleo

Cuando usarlo

Usar Rediar en caso de desórdenes digestivos en terneros jóvenes.

Dosis y consejos de utilización

Preparar una solución de Rediar mezclando 50 gr/litro de agua (40°C).
Una medida son 100 g.

A los primeros signos de diarrea:

- Añadir 25 grs de Rediar por litro de alimento lacteo (lacto-reemplazante)
- Aplicar un máximo de 3 días

En caso de diarrea severa:

- Retirar la leche (lacto-reemplazante)
- Administrar 2-3 litros de solución de Rediar 2 a 3 veces por día
- Administrar un máximo de 2 días
- Re-introducir, lentamente, el alimento lacteo añadiendo 25 grs de Rediar por litro de leche

En caso de riesgo o diarrea se recomienda la consulta con un veterinario.

Contactar

Trouw Nutrition España

Ronda de Poniente, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
España
T: + 34 918075420
F: + 34 918034439
www.trouwnutrition.com